

GlobZym Fol N 4

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO - Sangue uido

Biologico

NUTRIENTE, VEICOLANTE, ESCA PROTEICA

GlobZym Fol N 4 è un concime organico azotato uido, ottenuto dall'idrolisi enzimatica del derivato di sangue uido "globina", cioè solo le proteine del sangue. Esse, le più nobili da sempre disponibili sul mercato, non contengono sali aggiunti, e la tecnica di trasformazione enzimatica utilizzata, rende gli amminoacidi liberi ed inalterati rispetto all'origine.

GlobZym Fol N 4 favorisce la crescita dei frutti con alto peso specifico, ed ha un grande potere veicolante.

GlobZym Fol N 4 è consigliato per essere utilizzato via fogliare, sia da solo, che in miscela con prodotti per la difesa vegetale biologica, e/o i più comuni agrofarmaci. Questi ultimi se sistemici, aumentano la loro efficacia, grazie alla veicolazione resa dal prodotto, ed in tal modo possono essere utilizzati alle dosi minime consigliate.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	4 %
di cui: Azoto (N) organico	4 %
Carbonio (C) organico di origine biologica	14 %

MATERIE PRIME

(Prodotto ottenuto unicamente a partire dai FERTILIZZANTI del D.Lgs n.75/2010, Allegato 13, TABELLA 1)

Componenti organici: Sangue uido

Temperatura di immagazzinamento: $\geq 4^{\circ}\text{C}$ $\leq 35^{\circ}\text{C}$


Il prodotto non è combustibile, ed è stabile a temperature e pressioni ordinarie.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fogliare (q.tà / intervento)	Kg./Ha
Insieme ad agrofarmaci a base di zolfo o rame	1 - 1,5
insieme ad agrofarmaci (meglio sistemici)	2 - 3
da solo	4 - 6

Avvertenza: non utilizzare il prodotto con bagnanti e/o olii minerali.

Le dosi consigliate hanno valore indicativo, dovranno essere aumentate e/o diminuite tenendo in considerazione: le caratteristiche pedoclimatiche della zona di interesse, varietà colturale, l'attrezzatura utilizzata e l'esperienza dell'imprenditore agricolo.



CONFEZIONI

Cartone	n. 20 aconi da Kg. 1
Taniche	Kg. 6 - Kg. 12
Forma	Liquido



Restrizioni dell'uso - Art. 11, paragrafo 1, lettera c) Reg. CE/1069/2009: L'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati i fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni, volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali.

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni del D.Lgs n.75 del 29/04/2010 e successive modi che e/o integrazioni. Tutti i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. BIOS s.r.l. si riserva il diritto di modi carli senza obbligo di preavviso.